


마약류 오남용 예방을 위한

# 식욕억제제 안전 사용 방법



## 항정신성 식욕억제제란 무엇일까요?

뇌에 작용하여 식욕을 억제하는 약물로,  
배고픔을 덜 느끼게 하거나, 포만감을 증가시켜 주는  
항정신성의약품(마약류)을 말합니다.

## 어떤 의약품 성분이 있나요?

펜터민 / 펜디메트라진 / 디에틸프로피온(암페프라몬)  
마진돌 / 펜터민+토피라메이트복합제

\*토피라메이트 성분은 마약류로 지정되지는 않았습니다.

\*모든 마약류 의약품의 처방전에는 반드시 환자의 **성명과 주민등록번호**가 입력되어야 합니다.(근거법령 : 「마약류 관리에 관한 법률」 제32조제2항)

\*각 의약품 성분을 함유하고 있는 제품별 허가사항은  
식약처 의약품통합정보시스템([nedrug.mfds.go.kr](http://nedrug.mfds.go.kr))에서 확인하실 수 있습니다.

## 어떤 효능·효과가 있나요?

적절한 식이, 운동요법으로 감량되지 않는 비만환자의  
체중감량의 단기간 보조요법으로 사용됩니다.




**식욕억제제 사용 시 주의사항 ①**

# 병용금지

## 식욕억제제 성분간 병용복용 주의

다른 식욕억제제, 우울증치료제(플루옥세틴, 설트랄린 등)와  
같이 복용하지 않도록 주의하세요.




**식욕억제제 사용 시 주의사항 ②**

# 연령금기

## 성인을 대상으로 허가

식욕억제제는 성인을 대상으로 허가되어 있습니다.  
어린이 및 청소년은 복용하지 않도록 주의하세요.




식욕억제제 사용 시 주의사항 ③

# 복용기간 주의

## 식욕억제제는 4주 이내로 복용

단일제의 경우, 의사가 의학적으로  
추가처방이 필요하다고 판단 시, 3개월까지는 복용가능



# 국민이 안심할 수 있는 의약품 안전정보!



식품의약품안전처



한국의약품안전관리원